

DERIVATION

I. Notion de limite

1. Si la valeur d'une fonction f s'approche d'un nombre L quand la variable s'approche du nombre a , on dit que f a pour limite L en a et on note : $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$.
2. Plus précisément, $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ signifie que pour que $f(x)$ soit arbitrairement proche (C'est-à-dire aussi proche que l'on veut) de L , il suffit que x soit suffisamment proche de a .

II. Nombre dérivé

1. Accroissement moyen

Le nombre $\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}$ Est appelé accroissement moyen de la fonction f entre x_1 et x_2 .

2. Nombre dérivé


Si $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$ existe, on appelle ce nombre : nombre dérivé de la fonction f au point a . On le note $f'(a)$ et on dit que f est dérivable en a .

Remarque : On utilise souvent la définition équivalente :

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}.$$

3. Interprétation graphique

$f'(a)$ quand il existe est la pente de la droite tangente à la courbe représentative de f au point d'abscisse a . L'équation de cette tangente est $y = f'(a)(x - a) + f(a)$



Remarque : Dire que f est dérivable en a signifie donc que l'on peut parler de tangente au point d'abscisse a .

4. Approximation affine

Si h est voisin de 0, on a $f(a+h) \approx f(a) + f'(a) \times h$. ceci signifie que

$f(a) + f'(a) \times h$ est la fonction affine la plus proche possible de $f(a+h)$ quand h est proche de 0.

III. Fonction dérivée

1. Définition

La fonction telle que $x \rightarrow f'(x)$ est appelée fonction dérivée de la fonction f .

Remarque : La fonction dérivée peut être définie sur un intervalle plus petit que celui de f .

2. Règles de calcul

Si u et v sont des fonctions dérivables et k une constante on a les règles suivantes :

f	ku	$u+v$	uv	$\frac{1}{v}$	$\frac{u}{v}$	u^2	u^3
f'	ku'	$u'+v'$	$u'v+uv'$	$-\frac{v'}{v^2}$	$\frac{u'v-uv'}{v^2}$	$2u'u$	$3u'u^2$

3. Remarques : Les fonctions $\frac{1}{v}$ et $\frac{u}{v}$ ne sont définies et dérivables que pour x tel que $v(x) \neq 0$.

4. Dérivées des fonctions usuelles

$f(x)$	k	$ax+b$	x^2	x^n	$\frac{1}{x}$	$\frac{1}{x^n}$	\sqrt{x}	$\cos x$	$\sin x$
$f'(x)$	0	a	$2x$	nx^{n-1}	$-\frac{1}{x^2}$	$-\frac{n}{x^{n+1}}$	$\frac{1}{2\sqrt{x}}$	$\sin x$	$-\cos x$

Remarque : La dérivée de la fonction $x \rightarrow \sqrt{x}$ est définie sur un ensemble plus petit que la fonction elle-même. Les autres fonctions sont dérivables sur tout leur ensemble de définition.

5. Dérivée d'une fonction composée avec une fonction affine

Si u est une fonction dérivable alors la fonction f définie par $f(x) = u(ax+b)$ est dérivable et $f'(x) = au'(ax+b)$.